

پاسخ مسائل امتحان میان‌ترم ریاضی عمومی ۲، ترم ۲-۹۷-۹۶

۱. اگر $f(x, y) = \begin{cases} \frac{x^3 y}{x^2 + y^2} & (x, y) \neq (0, 0) \\ 0 & (x, y) = (0, 0) \end{cases}$ آنگاه مقدار $\frac{\partial^2 f}{\partial x \partial y}$ را در $(0, 0)$ محاسبه کنید.

حل. ابتدا ضابطه‌ی $\frac{\partial f}{\partial y}$ را بر \mathbb{R}^2 تعیین می‌کنیم.

$$\forall (x, y) \in \mathbb{R}^2, \quad \frac{\partial f}{\partial y}(x, y) = \begin{cases} \frac{\partial}{\partial y} \left(\frac{x^3 y}{x^2 + y^2} \right) & (x, y) \neq (0, 0) \\ \lim_{y \rightarrow 0} \frac{f(0, y) - f(0, 0)}{y} & (x, y) = (0, 0) \end{cases}$$

در نتیجه

$$\frac{\partial f}{\partial y}(x, y) = \begin{cases} \frac{x^3(x^2 + y^2) - 2y^2 x^3}{(x^2 + y^2)^2} & (x, y) \neq (0, 0) \\ 0 & (x, y) = (0, 0) \end{cases}$$

به این ترتیب

$$\begin{aligned} \frac{\partial^2 f}{\partial x \partial y}(0, 0) &= \frac{\partial}{\partial x} \left(\frac{\partial f}{\partial y} \right)(0, 0) = \lim_{x \rightarrow 0} \frac{\frac{\partial f}{\partial y}(x, 0) - \frac{\partial f}{\partial y}(0, 0)}{x} \\ &= \lim_{x \rightarrow 0} \frac{\frac{x^3}{x^2} - 0}{x} = 1 \end{aligned}$$

۲. تابع $f: \mathbb{R}^2 \rightarrow \mathbb{R}$ با ضابطه‌ی زیر مفروض است.

$$f(x, y) = \begin{cases} \frac{x\sqrt{x^2 + y^2}}{\sqrt{x^2 + y^2} + |xy|} & (x, y) \neq (0, 0) \\ 0 & (x, y) = (0, 0) \end{cases}$$

(الف) ثابت کنید f در $(0, 0)$ پیوسته است.

(ب) وجود مشتقات جزئی f را در $(0, 0)$ بررسی کنید.

حل. (الف) نشان می‌دهیم $\lim_{(x,y) \rightarrow (0,0)} f(x, y) = 0 = f(0, 0)$.

(روش اول) با استفاده از تعریف، نشان می‌دهیم

$$\forall \epsilon > 0, \exists \delta > 0, \quad \|(x, y) - (0, 0)\| < \delta \Rightarrow |f(x, y) - 0| < \epsilon$$

برای $\epsilon > 0$ ، با توجه به اینکه

$$|f(x, y) - 0| = \frac{|x|\sqrt{x^2 + y^2}}{\sqrt{x^2 + y^2} + |xy|} = |x| \frac{\sqrt{x^2 + y^2}}{\sqrt{x^2 + y^2} + |xy|} \leq |x| \leq \sqrt{x^2 + y^2} = \|(x, y) - (0, 0)\|$$

کافی است $\delta \leq \epsilon$ انتخاب شود.

(روش دوم) با توجه به نامساوی به دست آمده در بالا، یعنی $|f(x, y) - 0| \leq \|(x, y) - (0, 0)\|$ ، خواهیم داشت

$$\lim_{(x,y) \rightarrow (0,0)} f(x, y) = 0 = f(0, 0) \text{ و در نتیجه } 0 \leq \lim_{(x,y) \rightarrow (0,0)} |f(x, y) - 0| \leq \lim_{(x,y) \rightarrow (0,0)} \|(x, y) - (0, 0)\| = 0$$

(ب) با استفاده از تعریف،

$$\frac{\partial f}{\partial x}(0, 0) = \lim_{x \rightarrow 0} \frac{f(x, 0) - f(0, 0)}{x} = \lim_{x \rightarrow 0} \frac{\frac{x\sqrt{x^2}}{\sqrt{x^2} + |x \cdot 0|}}{x} = 1$$

به همین ترتیب،

$$\frac{\partial f}{\partial y}(0, 0) = \lim_{y \rightarrow 0} \frac{f(0, y) - f(0, 0)}{y} = \lim_{y \rightarrow 0} \frac{0 - 0}{y} = 0$$

۳. تابع $f: \mathbb{R}^2 \rightarrow \mathbb{R}$ با ضابطه $f(x, y) = \sqrt[3]{xy}$ مفروض است.

الف) کلیه‌ی سوی‌های یکه‌ی $\mathbf{u} = ai + bj$ را تعیین کنید که مشتق سویی f در (\circ, \circ) و در سوی \mathbf{u} وجود داشته باشد.
 ب) آیا f در (\circ, \circ) مشتق‌پذیر است؟ چرا؟

حل. الف) با استفاده از تعریف مشتق سویی،

$$D_{\mathbf{u}}f(\circ, \circ) = \lim_{t \rightarrow \circ} \frac{f(\circ + at, \circ + bt) - f(\circ, \circ)}{t} = \lim_{t \rightarrow \circ} \frac{\sqrt[3]{atbt} - \circ}{t} = \lim_{t \rightarrow \circ} \frac{t^{\frac{2}{3}} \sqrt[3]{ab}}{t} = \lim_{t \rightarrow \circ} \frac{\sqrt[3]{ab}}{t^{\frac{1}{3}}}$$

به این ترتیب اگر $ab \neq \circ$ حد فوق وجود نخواهد داشت. در حالتی که $ab = \circ$ آنگاه حد فوق برابر صفر بوده، مشتق سویی وجود دارد. در نتیجه فقط در سوی‌های i ، $-i$ ، j و $-j$ مشتق سویی وجود دارد.
 ب) بنابر قضایای بیان شده، اگر f در (\circ, \circ) مشتق‌پذیر باشد آنگاه مشتق سویی آن در تمام سوی‌ها در این نقطه وجود دارد. با توجه به قسمت قبل (عدم وجود مشتق سویی در سوی‌هایی که $ab \neq \circ$)، این تابع در (\circ, \circ) مشتق‌پذیر نیست.

۴. فرض کنید $f: \mathbb{R}^2 \rightarrow \mathbb{R}$ تابعی مشتق‌پذیر باشد. اگر z به عنوان تابعی مشتق‌پذیر بر حسب x و y به صورت ضمنی با معادله‌ی $f(x\sqrt{z}, y\sqrt{z}) = 0$ داده شده باشد، نشان دهید $x \frac{\partial z}{\partial x} + y \frac{\partial z}{\partial y} = -2z$.

حل. بنابه فرض تابع مشتق‌پذیر $z(x, y)$ وجود دارد که برای هر (x, y) در معادله‌ی زیر صدق می‌کند.

$$f(x\sqrt{z(x, y)}, y\sqrt{z(x, y)}) = 0$$

با قرار دادن $u = u(x, y) = x\sqrt{z(x, y)}$ و $v = v(x, y) = y\sqrt{z(x, y)}$ خواهیم داشت $f(u(x, y), v(x, y)) = 0$. در نتیجه

$$\begin{aligned} \frac{\partial}{\partial x} f(u(x, y), v(x, y)) = 0 &\Rightarrow f_u \frac{\partial u}{\partial x} + f_v \frac{\partial v}{\partial x} = 0 \\ &\Rightarrow f_u \left(\sqrt{z} + x \frac{1}{2\sqrt{z}} \frac{\partial z}{\partial x} \right) + f_v \left(y \frac{1}{2\sqrt{z}} \frac{\partial z}{\partial x} \right) = 0 \\ &\Rightarrow \frac{\partial z}{\partial x} = - \frac{\sqrt{z} f_u}{\frac{x}{2\sqrt{z}} f_u + \frac{y}{2\sqrt{z}} f_v} \end{aligned}$$

به همین ترتیب

$$\frac{\partial z}{\partial y} = - \frac{\sqrt{z} f_v}{\frac{x}{2\sqrt{z}} f_u + \frac{y}{2\sqrt{z}} f_v}$$

در نتیجه

$$x \frac{\partial z}{\partial x} + y \frac{\partial z}{\partial y} = - \frac{\sqrt{z}}{\frac{1}{2\sqrt{z}}} (x f_u + y f_v) = -2z$$

۵. در چه نقطه‌ای از رویه‌ی S به معادله‌ی $z = xy - y$ صفحه‌ی مماس بر S با صفحه‌ی $x + y + 2z = 0$ موازی است؟

حل. اگر تابع f با ضابطه‌ی $f(x, y, z) = xy - y - z$ تعریف شده باشد آنگاه S رویه‌ای به معادله‌ی $f(x, y, z) = 0$ خواهد بود. در نتیجه در هر نقطه از رویه، بردار ∇f بردار نرمال صفحه‌ی مماس بر رویه در آن نقطه خواهد بود. فرض کنیم $p \in S$ نقطه‌ای به مختصات (x_0, y_0, z_0) باشد که صفحه‌ی مماس بر S در این نقطه موازی صفحه‌ی $x + y + 2z = 0$ باشد. در نتیجه بردار نرمال صفحه‌ی مماس، یعنی $\nabla f(p)$ موازی بردار نرمال این صفحه، یعنی بردار $\mathbf{i} + \mathbf{j} + 2\mathbf{k}$ خواهد بود. به این ترتیب، اسکالر $\lambda \in \mathbb{R}$ وجود دارد که $\nabla f(p) = \lambda(\mathbf{i} + \mathbf{j} + 2\mathbf{k})$. با توجه به اینکه $\nabla f(p) = (y_0)\mathbf{i} + (x_0 - 1)\mathbf{j} + (-1)\mathbf{k}$ خواهیم داشت:

$$\begin{cases} y_0 = \lambda \\ x_0 - 1 = \lambda \\ (-1) = 2\lambda \end{cases}$$

در نتیجه $\lambda = -\frac{1}{2}$ و از آنجا $y_0 = -\frac{1}{2}$ ، $x_0 = 1 - \frac{1}{2} = \frac{1}{2}$ و $z_0 = x_0 y_0 - y_0 = \frac{1}{4}$ به این ترتیب نقطه‌ی مورد نظر نقطه‌ای به مختصات $(\frac{1}{2}, -\frac{1}{2}, \frac{1}{4})$ است.